

## ESQUEMA NACIONAL DE VACUNAS -PAI-

VACUNAS	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	EDAD DE APLICACIÓN	VIA DE APLICACIÓN	DOSIS Y REFUERZOS	HORARIO
<b>BCG</b>	Formas grave de tuberculosis	Recien Nacidos	Intradermica	solo una dosis	Todos los lunes
<b>Pentavalente</b>	Difteria tetanos,coqueluche, hepatitis B, neumonias y meningitis por Hib.	2,4,6 meses	Intramuscular	una dosis en lo que corresponda	
		18 a 23meses	Intramuscular	1er Refuerzo	
		De 4 años a los 5años	Intramuscular	2do. Refuerzo	
<b>Antipolio</b>	Poliomelitis	2 meses	Intramuscular	solo una dosis	Todos los días de 07:30 a 12:30
		4, 6, meses	Vio Oral	2 gotas en lo que corresponda	
		18 a 23 meses	Vio Oral	2 gotas en lo que	
		De 4 años a los 5 años	Vio Oral	corresponda	
<b>Neumococo</b>	Meumonias y Meningitis	2, 4, 6 meses	Intramuscular	una dosis en lo que corresponda	
<b>Antirovirus</b>	Diarrea severa por rotavirus	2 y 4 meses	Vio Oral	una dosis	
<b>Influenza Pediatrico</b>	Influenza Estacional	6 a 11 meses	Intramuscular	una dosis	
		12 a 23 meses	Intramuscular	una dosis (Refuerzo)	
<b>Influenza Pediatrico</b>	Influenza Estacional	Adultos mayores	Intramuscular	una dosis	
		personas de riesgo			
<b>S R P</b>	Sarampion, Rubeola, Parotiditis	12 a 23 meses	Subcutanea	una dosis	
<b>Dt. Adulto</b>	Toxoide tetanico			1ra al contacto	
				2da al mes	
		de 10 años a 50años	Intramuscular	3ra a los 6 meses	
				4ta al año	
				5ta al año	
<b>Fiebre Amarilla</b>	Fiebre Amarilla	12 a 23 meses	Subcutanea	una dosis	<b>CAMPAÑA 2017</b>